

SAMOBADANIE JĄDER



Rak jądra jest jednym z najczęściej występujących nowotworów u młodych mężczyzn – najwięcej zachorowań, bo aż **70%**, notuje się między **20. a 39. rokiem życia**.



Poznaj instrukcję i stosuj regularnie.



Badaj jądra w trakcie lub po ciepłej kąpieli, gdy mięśnie moszny są rozluźnione.

To tylko 5 minut raz w miesiącu.



SAMOBADANIE JĄDER

Co powinno Cię zaniepokoić?



Niebolesne powiększenie jądra.



Niebolesna masa, niedająca się oddzielić od jądra.



Uczucie ciężaru w mosznie.



Zaczerwienienie skóry moszny.



Ból i dyskomfort w obrębie moszny.

PAMIĘTAJ!

Nie każda zmiana to rak, ale z każdą zgłoś się do lekarza!

Ministerstwo
Zdrowia


NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia

SAMOBADANIE JĄDER

Jak prawidłowo wykonać samobadanie jąder?



Badaj jądra w kolejności. To normalne, że jedno jądro jest nieco mniejsze od drugiego.



Delikatnie przesuwaj jądra między palcami.



Wyczuź najądrza i wykonaj badanie od dołu.



SAMOBADANIE JĄDER

Jak prawidłowo wykonać samobadanie jąder?



Sprawdź, czy nie ma niepokojących zgrubień oraz wypukłości i czy kolor skóry nie zmienił się.



Obserwuj zmiany w wielkości, kształcie i konsystencji.



Podczas samobadania jąder nie powinieneś odczuwać żadnego bólu.

